

Dr. Klinghardt-Lyme-Cocktail

Notwendige Geräte zur Herstellung:

- ✓ Mixer
- ✓ Ultraschallgerät

Die Zubereitung (bitte die Abfolge einhalten)

- Nur so viel Wasser in einen Mixer geben, dass die Schneideblätter eben bedeckt sind.
 1. 200-800mg Artemisinin*: 2-8 Messlöffelchen
 2. 5-10 (1-2 Teelöffel) Gramm Ascorbinsäure oder besser eine natürliche Vit C Quelle (Rose Hips = Hagebutten Pulver***)
 3. LipoHealth*: 2 Messlöffel
 4. Mimosa Pudica Pulver*: ½-1 Teelöffel
 5. Quintessenz*: 4-6 Pipetten
 6. 100mg Micro Silica*: 1 Messlöffelchen
- Alle Zutaten mindestens 5 Min im Mixer mixen, bis die Masse cremige ist.
- Dann in ein Ultraschallgerät umfüllen und 15 Min lang beschallen. (Gut geeignet ist das Ultraschallgerät von der Firma Biopure.eu - www.biopure.eu, weil der Innentank herausnehmbar ist und leicht gereinigt werden kann). Dieser Prozess wandelt die Zutaten zu einem liposomalen Mus, dessen Bestandteile dann im Darm und auch von den Zellen sehr viel besser aufgenommen werden.
- Das Ganze in den Mixer zurückgeben und folgende Substanzen dazugeben, während der Mixer angeschaltet ist:
 7. D-Galaktose*: 5 g = 1 Teelöffel
 8. Propolis Tinktur* 20-25%: 10-20 Tr. (wenn es vertragen wird)
 9. Rechtsregulat*: 15 ml
 10. 1 gehäufte TL Deep Purple* (gefriergetrocknete Acai Beere und Granatapfel)
 11. unter immer noch laufendem Mixer ½ Glas Grapefruitsaft und ½ Glas Wasser zugeben
 12. anschließend einen Apfel und eine Orange.

Zusätzliche Optionen (nach ART/RD Testung!)

- 1 TL Mucunabohnenpulver**
- 10 Tr. Grapefruitkernextrakt**
- Knoblauch*: 4 Kapseln
- energetisiertes Neem*¹ 2 x 3 Kapseln

¹ Neem hat sich auch bei anderen Erkrankungen wie Tuberkulose oder Syphilis bewährt.

Wichtige Hinweise und Regeln zur Einnahme

- Das Einnahmeschema: Der Cocktail wird an 5 aufeinanderfolgenden Tagen eingenommen, dann wird für 2 Tage ausgesetzt. Diese Folge gilt für 3 Wochen, an die sich eine ganze Woche Pause anschließt. Dann wieder mit 5 Tagen Einnahme fortfahren usw.
- Grund für diese Anordnungen: Artemisinin regt im Darm die Bildung von Schutzfaktoren an (Dr. H. Lai) die die Aufnahme einiger Cocktail-Inhaltsstoffe hemmen. Durch die Pausenzeiten wird dies verhindert und die Aufnahme der Stoffe bleibt gewährleistet.
- **Anfangs nur 1/4 bis 1/3 der angegebenen Dosis 2-mal täglich einnehmen, langsam auf die empfohlene Dosis steigern** (Dieser sanfte Einstieg verhindert eine zu heftige Absterbereaktion der Erreger, durch die das Immunsystems zusätzlich geschwächt werden würde).
- Der Cocktail ist wirkungsvoller, wenn die zubereitete Menge auf einmal eingenommen wird. Allerdings kann es dann vermehrt zu Nebenwirkungen kommen (Breachreiz, Körperschmerzen, Fieber usw.). Deshalb empfehle ich anfangs die Einnahme in kleineren Dosen über den Tag verteilt.

Da sich verschiedene der Anteile, die nicht liposomal aufbereitet sind, im Mixer absetzen, muss immer wieder kurz im Mixer nachgemixt werden, bevor die nächste Dosis eingenommen wird. Den Cocktail im Kühlschrank lagern.

Viele unserer Patienten haben den Cocktail auch über einen längeren Zeitraum ohne Probleme und mit sehr, sehr guten Ergebnissen eingenommen. Im späteren Behandlungsverlauf wird die Einnahme auf 2-mal wöchentlich reduziert.

Im Labor sollte auf den Eisenspiegel geachtet werden, da Artemisinin in den Eisenstoffwechsel eingreifen kann.

Bezugsquellen

- * www.biopure.eu, fax: 089/90 40 615 5331
- ** Bezug über das Internet
- *** Apotheke oder Reformhaus